

FASOLA

ODMIANY SZPARAGOWE

badania w systemie PDO
ZDOO CZESŁAWICE

rok zbioru 2017






WAŻNIEJSZE CECHY UŻYTKOWE

Odmiana	Pochodzenie nasion	Udział strąków handlowych w plonie ogólnym %	Średnia długość strąków cm	Wysokość osadzenia najniżej położonych strąków cm	Liczba dni od siewu do zbioru
Arkana	SPÓJNIA	86,2	12,9	20,4	67
Batumi	SPÓJNIA	81,5	11,7	11,6	66
Eliza	SPÓJNIA	82,9	11,6	19,3	67
Finezja	POLAN	79,3	12,2	15,6	66
FZ 1/17 *		76,4	12,7	18,3	67
FZ 2/17 *		71,4	13,8	14,4	62
FZ 3/17 *		86,5	11,2	13,4	67
FZ 4/17 *		81,9	12,1	12,5	62
FZ 5/17 *		77,4	11,4	14,2	66
FZ 6/17 *		85,1	13,2	11,5	67
Carson	Syngenta Seeds	79,6	12,4	19,1	62 / 68
Luiza	POLAN	78,0	12,2	13,7	62 / 68

* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania
Odmiany Carson i Luiza mające żółte strąki, były zbierane dwukrotnie (po 62 i 68 dniach wegetacji);
pozostałe odmiany, które mają strąki zielone - były zbierane jednorazowo.


PLON OGÓLNY I PLON HANDLOWY STRĄKÓW (dt z ha)



* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania



UDZIAŁ W PLONIE POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI STRĄKÓW wg średnicy w mm



■ o średnicy < 6,5 mm
■ o średnicy 8,1 - 9,0 mm

■ o średnicy 6,5 - 8,0 mm
■ o średnicy 9,1 - 10,5 mm

* - nazwy odmian niezarejestrowanych zostały zakodowane na życzenie hodowców zlecających badania

