




# **Kapusta głowiasta biała badana w systemie PDO**

SDOO w Szczecinie Dąbiu  
wyniki z 2016 roku

# Odmiiany średniopóźne i późne – plonowanie badanych odmian



# Odmiany średniopóźne i późne - struktura plonu ogólnego badanych odmian

Odmiana	Zlecający badania/ Hodowca	Udział główek handlowych		Udział główek niehandlowych - chorych
		> 2,5 kg	1,2-2,5 kg	
		% ogólnej liczby główek		
Aros	H Moravoseed/PNOS Ożarów Maz.	31,9	67,5	0,5
Madison	H Moravoseed/PNOS Ożarów Maz.	78,8	18,1	3,1
Status	H Moravoseed/PNOS Ożarów Maz.	72,9	19,8	7,3
Lion	H Nickerson Zwaan	73,1	23,8	3,1
Ramco	H Syngenta	86,9	8,8	4,4

W doświadczeniu nie wystąpiły główki o masie < 1,2 kg,  
główki popękane i luźne

# Odmiany średniopóźne i późne

## - ważniejsze cechy użytkowe badanych odmian

Odmiana		Zlecający badania/ Hodowca	Średnia masa główki handlowej - kg	Udział głąba wewnętrznego w wysokości główki - %	Liczba dni od sadzenia do pierwszego zbioru
Aros	H	Moravoseed/PNOS Ożarów Maz.	2,4	51,0	157
Madison	H	Moravoseed/PNOS Ożarów Maz.	3,6	51,5	157
Status	H	Moravoseed/PNOS Ożarów Maz.	3,1	48,0	131
Lion	H	Nickerson Zwaan	3,2	42,3	157
Ramco	H	Syngenta	3,8	52,0	131