




# **Kapusta głowiasta biała badana w systemie PDO**

**ZDOO w Lisewie  
wyniki z 2016 roku**

# Odmiiany średniopóźne i późne – plonowanie badanych odmian



# Odmiiany średniopóźne i późne - struktura plonu ogólnego badanych odmian

Odmiana	Zlecający badania/ Hodowca		Udział główek handlowych		Udział główek niehandlowych		
			> 2,5 kg	1,2-2,5 kg	< 1,2 kg	popękanych	chorych
			% ogólnej liczby główek				
Aros	H	Moravoseed/PNOS Ożarów Maz.	92,1	2,1	3,2	0,0	2,6
Madison	H	Moravoseed/PNOS Ożarów Maz.	87,4	0,0	3,1	9,4	0,0
Status	H	Moravoseed/PNOS Ożarów Maz.	60,6	12,1	6,7	6,7	13,9
Lion	H	Nickerson Zwaan	90,5	5,7	3,8	0,0	0,0
Ramco	H	Syngenta	83,0	0,0	3,1	8,2	5,7

W doświadczeniu nie wystąpiły główki luźne

# Odmiany średniopóźne i późne

## - ważniejsze cechy użytkowe badanych odmian

Odmiana		Zlecający badania/ Hodowca	Średnia masa główki handlowej - kg	Udział głąba wewnętrznego w wysokości główki - %	Liczba dni od sadzenia do pierwszego zbioru
Aros	H	Moravoseed/PNOS Ożarów Maz.	2,8	49,5	156
Madison	H	Moravoseed/PNOS Ożarów Maz.	4,5	50,0	142
Status	H	Moravoseed/PNOS Ożarów Maz.	3,1	54,8	101
Lion	H	Nickerson Zwaan	3,1	46,1	156
Ramco	H	Syngenta	4,0	58,2	118