





**Wyniki doświadczenia
z odmianami ogórka,
uprawianymi pod folią,
badanymi w systemie PDO
w roku 2016**

Odmiiany konserwowe w uprawie pod folią - plon badanych odmian



** - odmiana w typie sałatkowym

Odmiiany konserwowe w uprawie pod folią - struktura plonu ogólnego



■ udział owoców I wyboru
■ udział owoców niekształtnych

■ udział owoców II wyboru

** - odmiana w typie sałatkowym

Odmiany konserwowe w uprawie pod folią

- ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana		Zlecający badania / Hodowca	Stosunek długości do szerokości owocu	Wskaźnik wczesności Reinholda - liczba dni	Udział komory nasiennej w średnicy owocu - %	Liczba dni od sadzenia do pierwszego zbioru	Średnia masa owocu handlowego - g
Brawo	H	PH-N W. Legutko	65,5	3,1	46,6	26	67
Bursztyn	H	SPÓJNIA Nochowo	63,3	3,2	50,0	26	78
Capricorn	H	R. Sekrecki / Yukselseed	65,7	4,0	54,3	26	86
Orfeus	H	PNOS Ożarów Maz. / Moravoseed	69,8	3,2	57,4	30	68
Orion**	H	SPÓJNIA Nochowo	63,5	5,7	44,8	26	225
Mirabelle	H	Monsanto/Seminis	67,4	3,6	51,1	26	76

** - odmiana w typie sałatkowym

Odmiiany konserwowe w uprawie pod folią

- ocena sensoryczna kwaszonych owoców po 1 i 3 miesiącach od zakwaszenia
- wybrane cechy

Odmiana	Zlecający badania / Hodowca	Smak owoców		Konsystencja owoców		Ogólna ocena sensoryczna	
		1 miesiąc	3 miesiące	1 miesiąc	3 miesiące	1 miesiąc	3 miesiące
Brawo	H PH-N W. Legutko	4,6	5,0	5,0	5,0	4,6	4,8
Capricorn	H R. Sekrecki / Yukselseed	4,1	3,3	5,0	4,4	4,5	4,2
Mirabelle	H Monsanto/Seminis	4,1	3,6	4,9	4,9	4,4	4,3